Formale Systeme

Prof. P.H. Schmitt

Fakultät für Informatik
Universität Karlsruhe (TH)

Winter 2007/2008

Vorlesungstermine

Do.17.01.

Fr.18.01.

Do.24.01.

letztes Übungsblatt

Praxisaufgabe zu SPIN

Fr.25.01. keine Vorlesung

Do.31.01.

Fr.01.02.

Do.07.02. keine Vorlesung

Fr.08.02 keine Vorlesung

Do.14.02 (Wiederholung)

Fr.15.02. keine Vorlesung

1.Klausur 18.02. 14:00

Büchi Automaten

Einführung

Unendliche Wörter

Sei V ein (weiterhin endliches) Alphabet.

Unendliche Wörter

Sei V ein (weiterhin endliches) Alphabet.

$$V^\omega$$

ist die Menge der unendlichen Wörter mit Buchstaben aus V .

Unendliche Wörter

Sei V ein (weiterhin endliches) Alphabet.

$$V^\omega$$

ist die Menge der unendlichen Wörter mit Buchstaben aus V .

$$w(n)$$

bezeichnet den n -ten Buchstaben in w und

Unendliche Wörter

Sei V ein (weiterhin endliches) Alphabet.

$$V^\omega$$

ist die Menge der unendlichen Wörter mit Buchstaben aus V .

$$w(n)$$

bezeichnet den n -ten Buchstaben in w und

$$w \downarrow (n)$$

das endliche Anfangstück $w(0) \dots w(n)$ von w .

Unendliche Wörter

Sei V ein (weiterhin endliches) Alphabet.

$$V^\omega$$

ist die Menge der unendlichen Wörter mit Buchstaben aus V .

$$w(n)$$

bezeichnet den n -ten Buchstaben in w und

$$w \downarrow (n)$$

das endliche Anfangstück $w(0) \dots w(n)$ von w .

Wir nennen ein Wort $w \in V^\omega$ manchmal auch ein ω -Wort über V .

Unendliche Wörter

Sei V ein (weiterhin endliches) Alphabet.

$$V^\omega$$

ist die Menge der unendlichen Wörter mit Buchstaben aus V .

$$w(n)$$

bezeichnet den n -ten Buchstaben in w und

$$w \downarrow (n)$$

das endliche Anfangstück $w(0) \dots w(n)$ von w .

Wir nennen ein Wort $w \in V^\omega$ manchmal auch ein ω -Wort über V .

Man kann ein unendliches Wort $w \in V^\omega$ auch als eine Funktion $w : \mathbf{N} \rightarrow V$, von den natürlichen Zahlen in das Alphabet auffassen.

Unendliche Wörter

Sei V ein (weiterhin endliches) Alphabet.

$$V^\omega$$

ist die Menge der unendlichen Wörter mit Buchstaben aus V .

$$w(n)$$

bezeichnet den n -ten Buchstaben in w und

$$w \downarrow (n)$$

das endliche Anfangstück $w(0) \dots w(n)$ von w .

Wir nennen ein Wort $w \in V^\omega$ manchmal auch ein ω -Wort über V .

Man kann ein unendliches Wort $w \in V^\omega$ auch als eine Funktion $w : \mathbf{N} \rightarrow V$, von den natürlichen Zahlen in das Alphabet auffassen.

Das leere Wort ε kommt **nicht** in V^ω vor.

Operationen

auf unendlichen Wörtern

Sei $K \subseteq V^*$ und $J \subseteq V^\omega$:

- 1 K^ω bezeichnet die Menge der unendlichen Wörter der Form

$w_1 \dots w_i \dots$ mit $w_i \in K$ für alle i

Operationen

auf unendlichen Wörtern

Sei $K \subseteq V^*$ und $J \subseteq V^\omega$:

- 1 K^ω bezeichnet die Menge der unendlichen Wörter der Form

$$w_1 \dots w_i \dots \text{ mit } w_i \in K \text{ für alle } i$$

- 2 $KJ = \{w_1w_2 \mid w_1 \in K, w_2 \in J\}$

Operationen

auf unendlichen Wörtern

Sei $K \subseteq V^*$ und $J \subseteq V^\omega$:

- 1 K^ω bezeichnet die Menge der unendlichen Wörter der Form

$$w_1 \dots w_i \dots \text{ mit } w_i \in K \text{ für alle } i$$

- 2

$$KJ = \{w_1w_2 \mid w_1 \in K, w_2 \in J\}$$

- 3

$$\vec{K} = \{w \in V^\omega \mid w \downarrow (n) \in K \text{ für unendlich viele } n\}$$

Operationen

auf unendlichen Wörtern

Sei $K \subseteq V^*$ und $J \subseteq V^\omega$:

- 1 K^ω bezeichnet die Menge der unendlichen Wörter der Form

$$w_1 \dots w_i \dots \text{ mit } w_i \in K \text{ für alle } i$$

- 2
$$KJ = \{w_1w_2 \mid w_1 \in K, w_2 \in J\}$$

- 3
$$\vec{K} = \{w \in V^\omega \mid w \downarrow (n) \in K \text{ für unendlich viele } n\}$$

Operationen

auf unendlichen Wörtern

Sei $K \subseteq V^*$ und $J \subseteq V^\omega$:

- 1 K^ω bezeichnet die Menge der unendlichen Wörter der Form

$$w_1 \dots w_i \dots \text{ mit } w_i \in K \text{ für alle } i$$

- 2
$$KJ = \{w_1w_2 \mid w_1 \in K, w_2 \in J\}$$

- 3
$$\vec{K} = \{w \in V^\omega \mid w \downarrow (n) \in K \text{ für unendlich viele } n\}$$

Manche Autoren benutzen $\lim(K)$ anstelle von $\vec{K}$.

Büchi Automaten

Sei $\mathcal{A} = (S, V, s_0, \delta, F)$ ein nicht deterministischer endlicher Automat.

Büchi Automaten

Sei $\mathcal{A} = (S, V, s_0, \delta, F)$ ein nicht deterministischer endlicher Automat.

Für ein ω -Wort $w \in V^\omega$ nennen wir eine Folge $s_0, \dots, s_n, \dots$ eine *Berechnungsfolge* (Englisch *run*) für w , wenn für alle $0 \leq n$ gilt

$$s_{n+1} \in \delta(s_n, w(n))$$

Büchi Automaten

Sei $\mathcal{A} = (S, V, s_0, \delta, F)$ ein nicht deterministischer endlicher Automat.

Für ein ω -Wort $w \in V^\omega$ nennen wir eine Folge $s_0, \dots, s_n, \dots$ eine *Berechnungsfolge* (Englisch *run*) für w , wenn für alle $0 \leq n$ gilt

$$s_{n+1} \in \delta(s_n, w(n))$$

Die von $\mathcal{A}$ akzeptierte ω -Sprache wird definiert durch

$$L^\omega(\mathcal{A}) = \{w \in V^\omega \mid \text{es gibt eine Berechnungsfolge für } w \text{ mit unendlich vielen Finalzuständen} \}$$

Büchi Automaten

Sei $\mathcal{A} = (S, V, s_0, \delta, F)$ ein nicht deterministischer endlicher Automat.

Für ein ω -Wort $w \in V^\omega$ nennen wir eine Folge $s_0, \dots, s_n, \dots$ eine *Berechnungsfolge* (Englisch *run*) für w , wenn für alle $0 \leq n$ gilt

$$s_{n+1} \in \delta(s_n, w(n))$$

Die von $\mathcal{A}$ akzeptierte ω -Sprache wird definiert durch

$$L^\omega(\mathcal{A}) = \{w \in V^\omega \mid \text{es gibt eine Berechnungsfolge für } w \text{ mit unendlich vielen Finalzuständen}\}$$

Der einzige Unterschied zwischen Büchi Automaten und (normalen) endlichen Automaten liegt in der Akzeptanzdefinition.

Beispiel 1

Beispiel 1

Die akzeptierte Sprache ist

$$\{a, b\}^* a^\omega$$

Beispiel 2

Beispiel 2

Die akzeptierte Sprache ist

$$(a^* b^+ a)^\omega + (a^* b^+ a)^* b^\omega$$

Entscheidbarkeit

Die Frage, ob für einen Büchi-Automaten $\mathcal{B}$ die Menge der akzeptierten Wörter nicht leer ist, d.h.

$$L^\omega(\mathcal{B}) \neq \emptyset,$$

ist entscheidbar.

Entscheidbarkeit

Die Frage, ob für einen Büchi-Automaten $\mathcal{B}$ die Menge der akzeptierten Wörter nicht leer ist, d.h.

$$L^\omega(\mathcal{B}) \neq \emptyset,$$

ist entscheidbar.

Beweis:

Entscheidbarkeit

Die Frage, ob für einen Büchi-Automaten $\mathcal{B}$ die Menge der akzeptierten Wörter nicht leer ist, d.h.

$$L^\omega(\mathcal{B}) \neq \emptyset,$$

ist entscheidbar.

Beweis:

Um $L^\omega(\mathcal{B}) \neq \emptyset$ zu zeigen muß man nur einen erreichbaren Endzustand $q_f \in F$ finden, der auf einer Schleife liegt. Diese Frage kann sogar in linearer Zeit beantwortet werden, z.B. durch den Tarjan-Paige Algorithmus.

Entscheidbarkeit

Die Frage, ob für einen Büchi-Automaten $\mathcal{B}$ die Menge der akzeptierten Wörter nicht leer ist, d.h.

$$L^\omega(\mathcal{B}) \neq \emptyset,$$

ist entscheidbar.

Beweis:

Um $L^\omega(\mathcal{B}) \neq \emptyset$ zu zeigen muß man nur einen erreichbaren Endzustand $q_f \in F$ finden, der auf einer Schleife liegt. Diese Frage kann sogar in linearer Zeit beantwortet werden, z.B. durch den Tarjan-Paige Algorithmus.

Wir nennen eine Menge L von ω -Wörtern **ω -regulär**, wenn es einen Büchi Automaten $\mathcal{A}$ gibt mit $L^\omega(\mathcal{A}) = L$.

Endliche und unendliche Akzeptanz

Sei $\mathcal{A}$ ein endlicher Automat und $K = L(\mathcal{A})$. Dann gilt

① $L^\omega(\mathcal{A}) \subseteq \vec{K}$

Endliche und unendliche Akzeptanz

Sei $\mathcal{A}$ ein endlicher Automat und $K = L(\mathcal{A})$. Dann gilt

- 1 $L^\omega(\mathcal{A}) \subseteq \vec{K}$
- 2 Falls $\mathcal{A}$ deterministisch ist gilt sogar $L^\omega(\mathcal{A}) = \vec{K}$

Endliche und unendliche Akzeptanz

Sei $\mathcal{A}$ ein endlicher Automat und $K = L(\mathcal{A})$. Dann gilt

- 1 $L^\omega(\mathcal{A}) \subseteq \vec{K}$
- 2 Falls $\mathcal{A}$ deterministisch ist gilt sogar $L^\omega(\mathcal{A}) = \vec{K}$

Endliche und unendliche Akzeptanz

Sei $\mathcal{A}$ ein endlicher Automat und $K = L(\mathcal{A})$. Dann gilt

- 1 $L^\omega(\mathcal{A}) \subseteq \vec{K}$
- 2 Falls $\mathcal{A}$ deterministisch ist gilt sogar $L^\omega(\mathcal{A}) = \vec{K}$

Beweis zu 1:

Endliche und unendliche Akzeptanz

Sei $\mathcal{A}$ ein endlicher Automat und $K = L(\mathcal{A})$. Dann gilt

- 1 $L^\omega(\mathcal{A}) \subseteq \vec{K}$
- 2 Falls $\mathcal{A}$ deterministisch ist gilt sogar $L^\omega(\mathcal{A}) = \vec{K}$

Beweis zu 1:

Für $w \in L^\omega(\mathcal{A})$ gibt es eine Berechnungsfolge $\rho_w = s_0, s_1 \dots s_n \dots$, so daß $F_w = \{n \in \mathbf{N} \mid s_n \in F\}$ unendlich ist.

Endliche und unendliche Akzeptanz

Sei $\mathcal{A}$ ein endlicher Automat und $K = L(\mathcal{A})$. Dann gilt

- 1 $L^\omega(\mathcal{A}) \subseteq \vec{K}$
- 2 Falls $\mathcal{A}$ deterministisch ist gilt sogar $L^\omega(\mathcal{A}) = \vec{K}$

Beweis zu 1:

Für $w \in L^\omega(\mathcal{A})$ gibt es eine Berechnungsfolge $\rho_w = s_0, s_1 \dots s_n \dots$, so daß $F_w = \{n \in \mathbf{N} \mid s_n \in F\}$ unendlich ist.

Für alle $n \in F_w$ gilt $s_n \in F$

Endliche und unendliche Akzeptanz

Sei $\mathcal{A}$ ein endlicher Automat und $K = L(\mathcal{A})$. Dann gilt

- 1 $L^\omega(\mathcal{A}) \subseteq \vec{K}$
- 2 Falls $\mathcal{A}$ deterministisch ist gilt sogar $L^\omega(\mathcal{A}) = \vec{K}$

Beweis zu 1:

Für $w \in L^\omega(\mathcal{A})$ gibt es eine Berechnungsfolge $\rho_w = s_0, s_1 \dots s_n \dots$, so daß $F_w = \{n \in \mathbf{N} \mid s_n \in F\}$ unendlich ist.

Für alle $n \in F_w$ gilt $s_n \in F$

$\Rightarrow w \downarrow (n) \in K$.

Endliche und unendliche Akzeptanz

Sei $\mathcal{A}$ ein endlicher Automat und $K = L(\mathcal{A})$. Dann gilt

- 1 $L^\omega(\mathcal{A}) \subseteq \vec{K}$
- 2 Falls $\mathcal{A}$ deterministisch ist gilt sogar $L^\omega(\mathcal{A}) = \vec{K}$

Beweis zu 1:

Für $w \in L^\omega(\mathcal{A})$ gibt es eine Berechnungsfolge $\rho_w = s_0, s_1 \dots s_n \dots$, so daß $F_w = \{n \in \mathbf{N} \mid s_n \in F\}$ unendlich ist.

Für alle $n \in F_w$ gilt $s_n \in F$

$\Rightarrow w \downarrow (n) \in K$.

Also $w \in \vec{K}$.

Endliche und unendliche Akzeptanz

Sei $\mathcal{A}$ ein endlicher Automat und $K = L(\mathcal{A})$. Dann gilt

- 1 $L^\omega(\mathcal{A}) \subseteq \vec{K}$
- 2 Falls $\mathcal{A}$ deterministisch ist gilt sogar $L^\omega(\mathcal{A}) = \vec{K}$

Beweis zu 2:

Endliche und unendliche Akzeptanz

Sei $\mathcal{A}$ ein endlicher Automat und $K = L(\mathcal{A})$. Dann gilt

- 1 $L^\omega(\mathcal{A}) \subseteq \vec{K}$
- 2 Falls $\mathcal{A}$ deterministisch ist gilt sogar $L^\omega(\mathcal{A}) = \vec{K}$

Beweis zu 2:

Für $w \in \vec{K}$ ist $R_w = \{n \in \mathbf{N} \mid w \downarrow (n) \in K\}$ unendlich.

Endliche und unendliche Akzeptanz

Sei $\mathcal{A}$ ein endlicher Automat und $K = L(\mathcal{A})$. Dann gilt

- 1 $L^\omega(\mathcal{A}) \subseteq \vec{K}$
- 2 Falls $\mathcal{A}$ deterministisch ist gilt sogar $L^\omega(\mathcal{A}) = \vec{K}$

Beweis zu 2:

Für $w \in \vec{K}$ ist $R_w = \{n \in \mathbf{N} \mid w \downarrow (n) \in K\}$ unendlich.

Für jedes $n \in R_w$ gibt es eine Berechnungsfolge $s_n = s_{n,1}, s_{n,2}, \dots, s_{n,l_n}$ für $w \downarrow (n)$.

Endliche und unendliche Akzeptanz

Sei $\mathcal{A}$ ein endlicher Automat und $K = L(\mathcal{A})$. Dann gilt

- 1 $L^\omega(\mathcal{A}) \subseteq \vec{K}$
- 2 Falls $\mathcal{A}$ deterministisch ist gilt sogar $L^\omega(\mathcal{A}) = \vec{K}$

Beweis zu 2:

Für $w \in \vec{K}$ ist $R_w = \{n \in \mathbf{N} \mid w \downarrow (n) \in K\}$ unendlich.

Für jedes $n \in R_w$ gibt es eine Berechnungsfolge $s_n = s_{n,1}, s_{n,2}, \dots, s_{n,l_n}$ für $w \downarrow (n)$.

Da $\mathcal{A}$ deterministisch ist, ist für jedes Paar $n, m \in R_w$ mit $n < m$ s_n Anfangsstück von s_m .

Endliche und unendliche Akzeptanz

Sei $\mathcal{A}$ ein endlicher Automat und $K = L(\mathcal{A})$. Dann gilt

- 1 $L^\omega(\mathcal{A}) \subseteq \vec{K}$
- 2 Falls $\mathcal{A}$ deterministisch ist gilt sogar $L^\omega(\mathcal{A}) = \vec{K}$

Beweis zu 2:

Für $w \in \vec{K}$ ist $R_w = \{n \in \mathbf{N} \mid w \downarrow (n) \in K\}$ unendlich.

Für jedes $n \in R_w$ gibt es eine Berechnungsfolge $s_n = s_{n,1}, s_{n,2}, \dots, s_{n,l_n}$ für $w \downarrow (n)$.

Da $\mathcal{A}$ deterministisch ist, ist für jedes Paar $n, m \in R_w$ mit $n < m$ s_n Anfangsstück von s_m .

Zusammengesetzt erhalten wir eine unendliche Berechnungsfolge s für w , die unendlich oft einen Endzustand durchläuft.

Endliche und unendliche Akzeptanz

Sei $\mathcal{A}$ ein endlicher Automat und $K = L(\mathcal{A})$. Dann gilt

- 1 $L^\omega(\mathcal{A}) \subseteq \vec{K}$
- 2 Falls $\mathcal{A}$ deterministisch ist gilt sogar $L^\omega(\mathcal{A}) = \vec{K}$

Beweis zu 2:

Für $w \in \vec{K}$ ist $R_w = \{n \in \mathbf{N} \mid w \downarrow (n) \in K\}$ unendlich.

Für jedes $n \in R_w$ gibt es eine Berechnungsfolge $s_n = s_{n,1}, s_{n,2}, \dots, s_{n,l_n}$ für $w \downarrow (n)$.

Da $\mathcal{A}$ deterministisch ist, ist für jedes Paar $n, m \in R_w$ mit $n < m$ s_n Anfangsstück von s_m .

Zusammengesetzt erhalten wir eine unendliche Berechnungsfolge s für w , die unendlich oft einen Endzustand durchläuft.

Also $w \in L^\omega(\mathcal{A})$.

Deterministische Büchi Automaten

und ihre regulären Mengen

Für eine ω -Sprache $L \subseteq V^\omega$ sind äquivalent:

- $L = L^\omega(\mathcal{A})$ für einen deterministischen Büchi Automaten

Deterministische Büchi Automaten

und ihre regulären Mengen

Für eine ω -Sprache $L \subseteq V^\omega$ sind äquivalent:

- $L = L^\omega(\mathcal{A})$ für einen deterministischen Büchi Automaten
- es eine reguläre Sprache $K \subseteq V^*$ gibt mit $L = \vec{K}$.

Deterministische Büchi Automaten

und ihre regulären Mengen

Für eine ω -Sprache $L \subseteq V^\omega$ sind äquivalent:

- $L = L^\omega(\mathcal{A})$ für einen deterministischen Büchi Automaten
- es eine reguläre Sprache $K \subseteq V^*$ gibt mit $L = \vec{K}$.

Deterministische Büchi Automaten

und ihre regulären Mengen

Für eine ω -Sprache $L \subseteq V^\omega$ sind äquivalent:

- $L = L^\omega(\mathcal{A})$ für einen deterministischen Büchi Automaten
- es eine reguläre Sprache $K \subseteq V^*$ gibt mit $L = \vec{K}$.

Beweis:

Deterministische Büchi Automaten und ihre regulären Mengen

Für eine ω -Sprache $L \subseteq V^\omega$ sind äquivalent:

- $L = L^\omega(\mathcal{A})$ für einen deterministischen Büchi Automaten
- es eine reguläre Sprache $K \subseteq V^*$ gibt mit $L = \vec{K}$.

Beweis:

Folgt direkt aus der Tatsache, daß für deterministische Automaten $\mathcal{A}$

$$L^\omega(\mathcal{A}) = \vec{L(\mathcal{A})}$$

gilt (vorangegangenes Lemma).

Der Beispielautomat N_{afin}

Der Beispielautomat N_{afin}

$$L^\omega(N_{afin}) = \{w \in \{a, b\}^\omega \mid \text{in } w \text{ kommt } b \text{ nur endlich oft vor}\}$$

Der Beispielautomat N_{afin}

$L^\omega(N_{afin}) = \{w \in \{a, b\}^\omega \mid \text{in } w \text{ kommt } b \text{ nur endlich oft vor}\}$
und $L(N_{afin}) = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ endet auf } a\}$.

Der Beispielautomat N_{afin}

$L^\omega(N_{afin}) = \{w \in \{a, b\}^\omega \mid \text{in } w \text{ kommt } b \text{ nur endlich oft vor}\}$

und $L(N_{afin}) = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ endet auf } a\}$.

Man sieht leicht, daß $L^\omega(N_{afin}) \neq \text{Lim}(L(N_{afin}))$

Deterministische Büchi Automaten

Es gibt Sprachen $L \subseteq V^\omega$, die von einem nicht-deterministischen Büchi Automaten akzeptiert werden, aber von keinem deterministischen.

Deterministische Büchi Automaten

Es gibt Sprachen $L \subseteq V^\omega$, die von einem nicht-deterministischen Büchi Automaten akzeptiert werden, aber von keinem deterministischen.

Beweis:

Deterministische Büchi Automaten

Es gibt Sprachen $L \subseteq V^\omega$, die von einem nicht-deterministischen Büchi Automaten akzeptiert werden, aber von keinem deterministischen.

Beweis:

Wir wählen $V = \{a, b\}$ und

$$L = L^\omega(N_{afin}) = \{w \in V^\omega \mid w(n) = b \text{ nur für endlich viele } n\}$$

Angenommen $L = \vec{K}$ für eine reguläre Menge $K \subseteq V^*$.

Deterministische Büchi Automaten

Es gibt Sprachen $L \subseteq V^\omega$, die von einem nicht-deterministischen Büchi Automaten akzeptiert werden, aber von keinem deterministischen.

Beweis:

Wir wählen $V = \{a, b\}$ und

$$L = L^\omega(N_{afin}) = \{w \in V^\omega \mid w(n) = b \text{ nur für endlich viele } n\}$$

Angenommen $L = \vec{K}$ für eine reguläre Menge $K \subseteq V^*$.

Es gibt ein $k_1 > 0$ mit $a^{k_1} \in K$, da $a^\omega \in L$.

Deterministische Büchi Automaten

Es gibt Sprachen $L \subseteq V^\omega$, die von einem nicht-deterministischen Büchi Automaten akzeptiert werden, aber von keinem deterministischen.

Beweis:

Wir wählen $V = \{a, b\}$ und

$$L = L^\omega(N_{afin}) = \{w \in V^\omega \mid w(n) = b \text{ nur für endlich viele } n\}$$

Angenommen $L = \vec{K}$ für eine reguläre Menge $K \subseteq V^*$.

Es gibt ein $k_1 > 0$ mit $a^{k_1} \in K$, da $a^\omega \in L$.

Dann gibt es auch ein $k_2 > 0$ mit $a^{k_1} b a^{k_2} \in K$, weil $a^{k_1} b a^\omega \in L$.

Deterministische Büchi Automaten

Es gibt Sprachen $L \subseteq V^\omega$, die von einem nicht-deterministischen Büchi Automaten akzeptiert werden, aber von keinem deterministischen.

Beweis:

Wir wählen $V = \{a, b\}$ und

$$L = L^\omega(N_{afin}) = \{w \in V^\omega \mid w(n) = b \text{ nur für endlich viele } n\}$$

Angenommen $L = \vec{K}$ für eine reguläre Menge $K \subseteq V^*$.

Es gibt ein $k_1 > 0$ mit $a^{k_1} \in K$, da $a^\omega \in L$.

Dann gibt es auch ein $k_2 > 0$ mit $a^{k_1} b a^{k_2} \in K$, weil $a^{k_1} b a^\omega \in L$.

So fortfahrend gibt es $k_i > 0$ für alle i mit $a^{k_1} b a^{k_2} b \dots b a^{k_i} \in K$.

Deterministische Büchi Automaten

Es gibt Sprachen $L \subseteq V^\omega$, die von einem nicht-deterministischen Büchi Automaten akzeptiert werden, aber von keinem deterministischen.

Beweis:

Wir wählen $V = \{a, b\}$ und

$$L = L^\omega(N_{afin}) = \{w \in V^\omega \mid w(n) = b \text{ nur für endlich viele } n\}$$

Angenommen $L = \vec{K}$ für eine reguläre Menge $K \subseteq V^*$.

Es gibt ein $k_1 > 0$ mit $a^{k_1} \in K$, da $a^\omega \in L$.

Dann gibt es auch ein $k_2 > 0$ mit $a^{k_1} b a^{k_2} \in K$, weil $a^{k_1} b a^\omega \in L$.

So fortfahrend gibt es $k_i > 0$ für alle i mit $a^{k_1} b a^{k_2} b \dots b a^{k_i} \in K$.

Wegen $L = \vec{K}$ folgt daraus auch $a^{k_1} b a^{k_2} b \dots b a^{k_i} b \dots \in L$

Deterministische Büchi Automaten

Es gibt Sprachen $L \subseteq V^\omega$, die von einem nicht-deterministischen Büchi Automaten akzeptiert werden, aber von keinem deterministischen.

Beweis:

Wir wählen $V = \{a, b\}$ und

$$L = L^\omega(N_{afin}) = \{w \in V^\omega \mid w(n) = b \text{ nur für endlich viele } n\}$$

Angenommen $L = \vec{K}$ für eine reguläre Menge $K \subseteq V^*$.

Es gibt ein $k_1 > 0$ mit $a^{k_1} \in K$, da $a^\omega \in L$.

Dann gibt es auch ein $k_2 > 0$ mit $a^{k_1} b a^{k_2} \in K$, weil $a^{k_1} b a^\omega \in L$.

So fortfahrend gibt es $k_i > 0$ für alle i mit $a^{k_1} b a^{k_2} b \dots b a^{k_i} \in K$.

Wegen $L = \vec{K}$ folgt daraus auch $a^{k_1} b a^{k_2} b \dots b a^{k_i} b \dots \in L$

im Widerspruch zur Definition von L .

Abschlußeigenschaften

Sind L_1, L_2 ω -reguläre Sprachen und ist K eine reguläre Sprache, dann ist auch

- 1 $L_1 \cup L_2$ ω -regulär,

Abschlußeigenschaften

Sind L_1, L_2 ω -reguläre Sprachen und ist K eine reguläre Sprache, dann ist auch

- 1 $L_1 \cup L_2$ ω -regulär,
- 2 K^ω ω -regulär, falls $\varepsilon \notin K$,

Abschlußeigenschaften

Sind L_1, L_2 ω -reguläre Sprachen und ist K eine reguläre Sprache, dann ist auch

- 1 $L_1 \cup L_2$ ω -regulär,
- 2 K^ω ω -regulär, falls $\varepsilon \notin K$,
- 3 KL_1 ω -regulär,

Abschlußeigenschaften

Sind L_1, L_2 ω -reguläre Sprachen und ist K eine reguläre Sprache, dann ist auch

- 1 $L_1 \cup L_2$ ω -regulär,
- 2 K^ω ω -regulär, falls $\varepsilon \notin K$,
- 3 KL_1 ω -regulär,
- 4 $V^\omega \setminus L_1$ ω -regulär,

Abschlußeigenschaften

Sind L_1, L_2 ω -reguläre Sprachen und ist K eine reguläre Sprache, dann ist auch

- 1 $L_1 \cup L_2$ ω -regulär,
- 2 K^ω ω -regulär, falls $\varepsilon \notin K$,
- 3 KL_1 ω -regulär,
- 4 $V^\omega \setminus L_1$ ω -regulär,
- 5 $L_1 \cap L_2$ ω -regulär.

Beweis

Abschlossenheit unter $\cup$

Seien $\mathcal{A}_i = (Q_i, V, s_0^i, \delta_i, F_i)$ für $i = 1, 2$ Büchi-Automaten und $L_i = L_i^\omega(\mathcal{A}_i)$.

Beweis

Abschlossenheit unter $\cup$

Seien $\mathcal{A}_i = (Q_i, V, s_0^i, \delta_i, F_i)$ für $i = 1, 2$ Büchi-Automaten und $L_i = L_i^\omega(\mathcal{A}_i)$.

Wir können ohne Beschränkung der Allgemeinheit annehmen, daß

$$Q_1 \cap Q_2 = \emptyset$$

Beweis

Abschlossenheit unter $\cup$

Seien $\mathcal{A}_i = (Q_i, V, s_0^i, \delta_i, F_i)$ für $i = 1, 2$ Büchi-Automaten und $L_i = L_i^\omega(\mathcal{A}_i)$.

Wir können ohne Beschränkung der Allgemeinheit annehmen, daß $Q_1 \cap Q_2 = \emptyset$

Wir konstruieren einen Büchi-Automaten $\mathcal{A} = (Q, V, s_0, \delta, F)$, wobei s_0 ein neuer Zustand ist, der weder in Q_1 noch in Q_2 vorkommt.

Beweis

Abschlossenheit unter $\cup$

Seien $\mathcal{A}_i = (Q_i, V, s_0^i, \delta_i, F_i)$ für $i = 1, 2$ Büchi-Automaten und $L_i = L_i^\omega(\mathcal{A}_i)$.

Wir können ohne Beschränkung der Allgemeinheit annehmen, daß $Q_1 \cap Q_2 = \emptyset$

Wir konstruieren einen Büchi-Automaten $\mathcal{A} = (Q, V, s_0, \delta, F)$, wobei s_0 ein neuer Zustand ist, der weder in Q_1 noch in Q_2 vorkommt.

$$\begin{aligned} Q &= Q_1 \cup Q_2 \cup \{s_0\} \\ \delta(q, a) &= \delta_i(q, a) && \text{falls } q \in Q_i \\ \delta(s_0, a) &= \delta_1(s_0^1, a) \cup \delta_2(s_0^2, a) \\ F &= F_1 \cup F_2 \end{aligned}$$

Beweis

Abschlossenheit unter $\cup$

Seien $\mathcal{A}_i = (Q_i, V, s_0^i, \delta_i, F_i)$ für $i = 1, 2$ Büchi-Automaten und $L_i = L_i^\omega(\mathcal{A}_i)$.

Wir können ohne Beschränkung der Allgemeinheit annehmen, daß $Q_1 \cap Q_2 = \emptyset$

Wir konstruieren einen Büchi-Automaten $\mathcal{A} = (Q, V, s_0, \delta, F)$, wobei s_0 ein neuer Zustand ist, der weder in Q_1 noch in Q_2 vorkommt.

$$\begin{aligned} Q &= Q_1 \cup Q_2 \cup \{s_0\} \\ \delta(q, a) &= \delta_i(q, a) && \text{falls } q \in Q_i \\ \delta(s_0, a) &= \delta_1(s_0^1, a) \cup \delta_2(s_0^2, a) \\ F &= F_1 \cup F_2 \end{aligned}$$

Man zeigt leicht, daß $L^\omega(\mathcal{A}) = L_1 \cup L_2$.

Abgeschlossenheit unter Iteration

Erster Versuch

Sei $A = (Q_A, V, s_0^A, \delta_A, F_A)$ ein nichtdeterministischer endlicher Automat mit $L(A) = K$.

Abgeschlossenheit unter Iteration

Erster Versuch

Sei $A = (Q_A, V, s_0^A, \delta_A, F_A)$ ein nichtdeterministischer endlicher Automat mit $L(A) = K$.

Automaten $B = (Q_B, V, s_0^B, \delta_B, F_B)$ sei definiert durch:

Abgeschlossenheit unter Iteration

Erster Versuch

Sei $A = (Q_A, V, s_0^A, \delta_A, F_A)$ ein nichtdeterministischer endlicher Automat mit $L(A) = K$.

Automaten $B = (Q_B, V, s_0^B, \delta_B, F_B)$ sei definiert durch:

$$\begin{aligned} Q_B &= Q_A \\ s_0^B &= s_0^A \\ \delta_B(q, x) &= \delta_A(q, x) && \text{falls } q \notin F_A, x \in V \\ \delta_B(q, x) &= \delta_A(q, x) \cup \delta_A(s_0^A, x) && \text{falls } q \in F_A, x \in V \\ F_B &= F_A \end{aligned}$$

Abgeschlossenheit unter Iteration

Erster Versuch

Sei $A = (Q_A, V, s_0^A, \delta_A, F_A)$ ein nichtdeterministischer endlicher Automat mit $L(A) = K$.

Automaten $B = (Q_B, V, s_0^B, \delta_B, F_B)$ sei definiert durch:

$$\begin{aligned} Q_B &= Q_A \\ s_0^B &= s_0^A \\ \delta_B(q, x) &= \delta_A(q, x) && \text{falls } q \notin F_A, x \in V \\ \delta_B(q, x) &= \delta_A(q, x) \cup \delta_A(s_0^A, x) && \text{falls } q \in F_A, x \in V \\ F_B &= F_A \end{aligned}$$

Es gilt $L^\omega(B) \neq K^\omega$

Gegenbeispiel

zu ersten Versuch

Sei $\mathcal{A}$ der Automat

Es gilt

$$K = L(\mathcal{A}) = a\{a, b\}^*$$

Die auf der letzten Folie beschriebene Konstruktion ändert $\mathcal{A}$ nicht. Aber

$$L^\omega(\mathcal{A}) \neq K^\omega$$

z.B. $ab^\omega \in L^\omega(\mathcal{A})$ aber $ab^\omega \notin K^\omega$

Abgeschlossenheit unter Iteration

Zweiter Versuch

Der Automaten $\mathcal{B} = (Q_B, V, s_0^B, \delta_B, F_B)$ sei definiert durch:

$$\begin{aligned} Q_B &= Q_A \\ s_0^B &= s_0^A \\ \delta_B(q, a) &= \delta_A(q, a) \quad \text{falls } q \in Q_B \\ \delta_B(q, \epsilon) &= \{s_0^B\} \quad \text{falls } q \in F_A \\ F_B &= \{s_0^B\} \end{aligned}$$

Beispiel zur Komplementbildung

Beispiel zur Komplementbildung

$$L^\omega(N_{ba}) = \{w \in \{a, b, c\}^\omega \mid \text{nach jedem } a \text{ kommt ein } b\}$$

Beispiel zur Komplementbildung

$$L^\omega(N_{ba}) = \{w \in \{a, b, c\}^\omega \mid \text{nach jedem } a \text{ kommt ein } b\}$$

Die Abgeschlossenheit
 ω -regulärer Mengen
unter Komplementbildung
muß noch bewiesen werden.

Zerlegungssatz

$L \subseteq V^\omega$ ist ω -regulär, genau dann, wenn L eine endliche Vereinigung von Mengen der Form

$$JK^\omega$$

für reguläre Mengen $J, K \subseteq V^*$ ist, wobei $\varepsilon \notin K$.

Zerlegungssatz

$L \subseteq V^\omega$ ist ω -regulär, genau dann, wenn L eine endliche Vereinigung von Mengen der Form

$$JK^\omega$$

für reguläre Mengen $J, K \subseteq V^*$ ist, wobei $\varepsilon \notin K$.

Beweis:

Zerlegungssatz

$L \subseteq V^\omega$ ist ω -regulär, genau dann, wenn L eine endliche Vereinigung von Mengen der Form

$$JK^\omega$$

für reguläre Mengen $J, K \subseteq V^*$ ist, wobei $\varepsilon \notin K$.

Beweis:

Sei $A = (Q, V, s_0, \delta, F)$ ein Büchi-Automat mit $L^\omega(A) = L$.

Zerlegungssatz

$L \subseteq V^\omega$ ist ω -regulär, genau dann, wenn L eine endliche Vereinigung von Mengen der Form

$$JK^\omega$$

für reguläre Mengen $J, K \subseteq V^*$ ist, wobei $\varepsilon \notin K$.

Beweis:

Sei $A = (Q, V, s_0, \delta, F)$ ein Büchi-Automat mit $L^\omega(A) = L$.

Für $p, q \in Q$ sei

$$L_{p,q} = \{w \in V^* \mid q \in \delta(p, w)\}$$

Zerlegungssatz

$L \subseteq V^\omega$ ist ω -regulär, genau dann, wenn L eine endliche Vereinigung von Mengen der Form

$$JK^\omega$$

für reguläre Mengen $J, K \subseteq V^*$ ist, wobei $\varepsilon \notin K$.

Beweis:

Sei $A = (Q, V, s_0, \delta, F)$ ein Büchi-Automat mit $L^\omega(A) = L$.

Für $p, q \in Q$ sei

$$L_{p,q} = \{w \in V^* \mid q \in \delta(p, w)\}$$

Jedes $L_{p,q} \subseteq V^*$ ist eine reguläre Menge.

Zerlegungssatz

$L \subseteq V^\omega$ ist ω -regulär, genau dann, wenn L eine endliche Vereinigung von Mengen der Form

$$JK^\omega$$

für reguläre Mengen $J, K \subseteq V^*$ ist, wobei $\varepsilon \notin K$.

Beweis:

Sei $A = (Q, V, s_0, \delta, F)$ ein Büchi-Automat mit $L^\omega(A) = L$.

Für $p, q \in Q$ sei

$$L_{p,q} = \{w \in V^* \mid q \in \delta(p, w)\}$$

Jedes $L_{p,q} \subseteq V^*$ ist eine reguläre Menge. Außerdem gilt

$$L = \bigcup_{p \in F} L_{s_0,p} L_{p,p}^\omega.$$

Zerlegungssatz

$L \subseteq V^\omega$ ist ω -regulär, genau dann, wenn L eine endliche Vereinigung von Mengen der Form

$$JK^\omega$$

für reguläre Mengen $J, K \subseteq V^*$ ist, wobei $\varepsilon \notin K$.

Beweis:

Sei $A = (Q, V, s_0, \delta, F)$ ein Büchi-Automat mit $L^\omega(A) = L$.

Für $p, q \in Q$ sei

$$L_{p,q} = \{w \in V^* \mid q \in \delta(p, w)\}$$

Jedes $L_{p,q} \subseteq V^*$ ist eine reguläre Menge. Außerdem gilt

$$L = \bigcup_{p \in F} L_{s_0,p} L_{p,p}^\omega.$$

Die umgekehrte Implikation folgt aus den Abschlusseigenschaften.

Definitionen

$A = (Q, V, s_0, \delta, F)$ ein Büchi-Automat, $p, q \in Q$ und $u, w \in V^*$

$$\textcircled{1} L_{p,q} = \{w \in V^* \mid q \in \delta(p, w)\}$$

Definitionen

$A = (Q, V, s_0, \delta, F)$ ein Büchi-Automat, $p, q \in Q$ und $u, w \in V^*$

① $L_{p,q} = \{w \in V^* \mid q \in \delta(p, w)\}$

② $L_{p,q}^F = \{w = a_0 \dots a_k \in V^* \mid \text{es gibt eine Folge von Zuständen } q_0, \dots, q_k \text{ mit}$
 $q_0 = p \quad q_k = q \text{ und}$
 $q_{i+1} \in \delta(q_i, a_i) \text{ für alle } 0 \leq i < k \text{ und}$
 $q_i \in F \text{ für ein } 0 \leq i \leq k\}$

Definitionen

$A = (Q, V, s_0, \delta, F)$ ein Büchi-Automat, $p, q \in Q$ und $u, w \in V^*$

- ① $L_{p,q} = \{w \in V^* \mid q \in \delta(p, w)\}$
- ② $L_{p,q}^F = \{w = a_0 \dots a_k \in V^* \mid \text{es gibt eine Folge von Zuständen } q_0, \dots, q_k \text{ mit}$
 $q_0 = p \quad q_k = q \text{ und}$
 $q_{i+1} \in \delta(q_i, a_i) \text{ für alle } 0 \leq i < k \text{ und}$
 $q_i \in F \text{ für ein } 0 \leq i \leq k\}$
- ③ $u \equiv_A w$ gdw für alle $p, q \in Q$ gilt

$$\begin{aligned} u \in L_{p,q} &\Leftrightarrow w \in L_{p,q} \\ u \in L_{p,q}^F &\Leftrightarrow w \in L_{p,q}^F \end{aligned}$$

Offensichtliche Konsequenzen

Offensichtlich gilt stets

$$L_{p,q}^F \subseteq L_{p,q}$$

Offensichtliche Konsequenzen

Offensichtlich gilt stets

$$L_{p,q}^F \subseteq L_{p,q}$$

falls $p \in F$ oder $q \in F$ auch

$$L_{p,q}^F = L_{p,q}.$$

Offensichtliche Konsequenzen

Offensichtlich gilt stets

$$L_{p,q}^F \subseteq L_{p,q}$$

falls $p \in F$ oder $q \in F$ auch

$$L_{p,q}^F = L_{p,q}.$$

$\equiv_A$ ist eine Äquivalenzrelation ist.

Eigenschaften von $\equiv_A$

- 1 für alle $p, q \in Q$ sind $L_{p,q}^F$ und $L_{p,q}$ reguläre Mengen,

Eigenschaften von $\equiv_A$

- 1 für alle $p, q \in Q$ sind $L_{p,q}^F$ und $L_{p,q}$ reguläre Mengen,
- 2 jede Äquivalenzklasse von $\equiv_A$ ist von der Form

$$\bigcap_{(p,q) \in P} L_{p,q} \cap \bigcap_{(p,q) \notin P} \sim L_{p,q} \cap \bigcap_{(p,q) \in R} L_{p,q}^F \cap \bigcap_{(p,q) \notin R} \sim L_{p,q}^F$$

für geeignete Teilmengen $P, R \subseteq Q \times Q$.

Eigenschaften von $\equiv_A$

- 1 für alle $p, q \in Q$ sind $L_{p,q}^F$ und $L_{p,q}$ reguläre Mengen,
- 2 jede Äquivalenzklasse von $\equiv_A$ ist von der Form

$$\bigcap_{(p,q) \in P} L_{p,q} \cap \bigcap_{(p,q) \notin P} \sim L_{p,q} \cap \bigcap_{(p,q) \in R} L_{p,q}^F \cap \bigcap_{(p,q) \notin R} \sim L_{p,q}^F$$

für geeignete Teilmengen $P, R \subseteq Q \times Q$.

- 3 $\equiv_A$ besitzt endlich viele Äquivalenzklassen,

Eigenschaften von $\equiv_A$

- 1 für alle $p, q \in Q$ sind $L_{p,q}^F$ und $L_{p,q}$ reguläre Mengen,
- 2 jede Äquivalenzklasse von $\equiv_A$ ist von der Form

$$\bigcap_{(p,q) \in P} L_{p,q} \cap \bigcap_{(p,q) \notin P} \sim L_{p,q} \cap \bigcap_{(p,q) \in R} L_{p,q}^F \cap \bigcap_{(p,q) \notin R} \sim L_{p,q}^F$$

für geeignete Teilmengen $P, R \subseteq Q \times Q$.

- 3 $\equiv_A$ besitzt endlich viele Äquivalenzklassen,
- 4 jede Äquivalenzklasse von $\equiv_A$ ist eine reguläre Menge,

Eigenschaften von $\equiv_A$

- 1 für alle $p, q \in Q$ sind $L_{p,q}^F$ und $L_{p,q}$ reguläre Mengen,
- 2 jede Äquivalenzklasse von $\equiv_A$ ist von der Form

$$\bigcap_{(p,q) \in P} L_{p,q} \cap \bigcap_{(p,q) \notin P} \sim L_{p,q} \cap \bigcap_{(p,q) \in R} L_{p,q}^F \cap \bigcap_{(p,q) \notin R} \sim L_{p,q}^F$$

für geeignete Teilmengen $P, R \subseteq Q \times Q$.

- 3 $\equiv_A$ besitzt endlich viele Äquivalenzklassen,
- 4 jede Äquivalenzklasse von $\equiv_A$ ist eine reguläre Menge,
- 5 sind U_1, U_2 Äquivalenzklassen von $\equiv_A$, dann folgt aus $U_1 U_2^\omega \cap L^\omega(A) \neq \emptyset$ schon $U_1 U_2^\omega \subseteq L^\omega(A)$

Beweis

Teil 1

Für alle $p, q \in Q$ sind $L_{p,q}^F$ und $L_{p,q}$ reguläre Mengen.

Beweis

Teil 1

Für alle $p, q \in Q$ sind $L_{p,q}^F$ und $L_{p,q}$ reguläre Mengen.

Für $L_{p,q}$ wurde das schon im Beweis des Zerlegungssatzes benutzt.

Beweis

Teil 1

Für alle $p, q \in Q$ sind $L_{p,q}^F$ und $L_{p,q}$ reguläre Mengen.

Für $L_{p,q}$ wurde das schon im Beweis des Zerlegungssatzes benutzt.

Wegen

$$L_{p,q}^F = \bigcup_{f \in F} L_{p,f} L_{f,q}$$

folgt auch die Regularität von $L_{p,q}^F$.

Beweis

Teil 2

Jede Äquivalenzklasse von $\equiv_A$ ist von der Form

$$\bigcap_{(p,q) \in P} L_{p,q} \cap \bigcap_{(p,q) \notin P} \sim L_{p,q} \cap \bigcap_{(p,q) \in R} L_{p,q}^F \cap \bigcap_{(p,q) \notin R} \sim L_{p,q}^F$$

für geeignete Teilmengen $P, R \subseteq Q \times Q$.

Beweis

Teil 2

Jede Äquivalenzklasse von $\equiv_A$ ist von der Form

$$\bigcap_{(p,q) \in P} L_{p,q} \cap \bigcap_{(p,q) \notin P} \sim L_{p,q} \cap \bigcap_{(p,q) \in R} L_{p,q}^F \cap \bigcap_{(p,q) \notin R} \sim L_{p,q}^F$$

für geeignete Teilmengen $P, R \subseteq Q \times Q$.

Für die Äquivalenzklasse $M(u)$ von $u \in V^\omega$ gilt

Beweis

Teil 2

Jede Äquivalenzklasse von $\equiv_A$ ist von der Form

$$\bigcap_{(p,q) \in P} L_{p,q} \cap \bigcap_{(p,q) \notin P} \sim L_{p,q} \cap \bigcap_{(p,q) \in R} L_{p,q}^F \cap \bigcap_{(p,q) \notin R} \sim L_{p,q}^F$$

für geeignete Teilmengen $P, R \subseteq Q \times Q$.

Für die Äquivalenzklasse $M(u)$ von $u \in V^\omega$ gilt

$$M(u) \subseteq L_{p,q} \quad \text{falls} \quad u \in L_{p,q}$$

Beweis

Teil 2

Jede Äquivalenzklasse von $\equiv_A$ ist von der Form

$$\bigcap_{(p,q) \in P} L_{p,q} \cap \bigcap_{(p,q) \notin P} \sim L_{p,q} \cap \bigcap_{(p,q) \in R} L_{p,q}^F \cap \bigcap_{(p,q) \notin R} \sim L_{p,q}^F$$

für geeignete Teilmengen $P, R \subseteq Q \times Q$.

Für die Äquivalenzklasse $M(u)$ von $u \in V^\omega$ gilt

$$M(u) \subseteq L_{p,q} \quad \text{falls} \quad u \in L_{p,q}$$

$$M(u) \subseteq \sim L_{p,q} \quad \text{falls} \quad u \notin L_{p,q}$$

Beweis

Teil 2

Jede Äquivalenzklasse von $\equiv_A$ ist von der Form

$$\bigcap_{(p,q) \in P} L_{p,q} \cap \bigcap_{(p,q) \notin P} \sim L_{p,q} \cap \bigcap_{(p,q) \in R} L_{p,q}^F \cap \bigcap_{(p,q) \notin R} \sim L_{p,q}^F$$

für geeignete Teilmengen $P, R \subseteq Q \times Q$.

Für die Äquivalenzklasse $M(u)$ von $u \in V^\omega$ gilt

$$M(u) \subseteq L_{p,q} \quad \text{falls} \quad u \in L_{p,q}$$

$$M(u) \subseteq \sim L_{p,q} \quad \text{falls} \quad u \notin L_{p,q}$$

$$M(u) \subseteq L_{p,q}^F \quad \text{falls} \quad u \in L_{p,q}^F$$

Beweis

Teil 2

Jede Äquivalenzklasse von $\equiv_A$ ist von der Form

$$\bigcap_{(p,q) \in P} L_{p,q} \cap \bigcap_{(p,q) \notin P} \sim L_{p,q} \cap \bigcap_{(p,q) \in R} L_{p,q}^F \cap \bigcap_{(p,q) \notin R} \sim L_{p,q}^F$$

für geeignete Teilmengen $P, R \subseteq Q \times Q$.

Für die Äquivalenzklasse $M(u)$ von $u \in V^\omega$ gilt

$$M(u) \subseteq L_{p,q} \quad \text{falls} \quad u \in L_{p,q}$$

$$M(u) \subseteq \sim L_{p,q} \quad \text{falls} \quad u \notin L_{p,q}$$

$$M(u) \subseteq L_{p,q}^F \quad \text{falls} \quad u \in L_{p,q}^F$$

$$M(u) \subseteq \sim L_{p,q}^F \quad \text{falls} \quad u \notin L_{p,q}^F$$

Beweis

Teil 2, Fortsetzung

$$M(u) \subseteq$$

$$\bigcap_{(p,q) \in P} L_{p,q} \cap \bigcap_{(p,q) \notin P} \sim L_{p,q} \cap \bigcap_{(p,q) \in R} L_{p,q}^F \cap \bigcap_{(p,q) \notin R} \sim L_{p,q}^F$$

für

$$P = \{(p, q) \in Q^2 \mid u \in L_{p,q}\}$$

$$R = \{(p, q) \in Q^2 \mid u \in L_{p,q}^F\}$$

Beweis

Teil 2, Fortsetzung

$$M(u) \subseteq$$

$$\bigcap_{(p,q) \in P} L_{p,q} \cap \bigcap_{(p,q) \notin P} \sim L_{p,q} \cap \bigcap_{(p,q) \in R} L_{p,q}^F \cap \bigcap_{(p,q) \notin R} \sim L_{p,q}^F$$

für

$$P = \{(p, q) \in Q^2 \mid u \in L_{p,q}\}$$

$$R = \{(p, q) \in Q^2 \mid u \in L_{p,q}^F\}$$

Gleichheit folgt aus der Definition von $\equiv_A$.

Beweis

Teil 3

$\equiv_A$ besitzt endlich viele Äquivalenzklassen,

Beweis

Teil 3

$\equiv_A$ besitzt endlich viele Äquivalenzklassen,

Es gibt nur endlich viele Möglichkeiten die Mengen

$$P, Q \subseteq Q^2$$

in der Darstellung nach Teil 2 zu wählen.

Beweis

Teil 4

Jede Äquivalenzklasse von $\equiv_A$ ist eine reguläre Menge.

folgt aus 1, 2 und den Abschlußigenschaften regulärer Mengen.

Beweis

Teil 5

Sei $w \in U_1 U_2^\omega \cap L^\omega(A)$ gegeben und u ein weiteres Wort aus $U_1 U_2^\omega$. Es ist $u \in L^\omega(A)$ zu zeigen.

Beweis

Teil 5

Sei $w \in U_1 U_2^\omega \cap L^\omega(A)$ gegeben und u ein weiteres Wort aus $U_1 U_2^\omega$. Es ist $u \in L^\omega(A)$ zu zeigen.

Wegen $w \in U_1 U_2^\omega$ können wir w wie folgt zerlegen:

$$w = w_1 w_2 \dots w_n \dots$$

wobei $w_1 \in U_1$ und $w_i \in U_2$ für alle $i > 1$.

Beweis

Teil 5

Sei $w \in U_1 U_2^\omega \cap L^\omega(A)$ gegeben und u ein weiteres Wort aus $U_1 U_2^\omega$. Es ist $u \in L^\omega(A)$ zu zeigen.

Wegen $w \in U_1 U_2^\omega$ können wir w wie folgt zerlegen:

$$w = w_1 w_2 \dots w_n \dots$$

wobei $w_1 \in U_1$ und $w_i \in U_2$ für alle $i > 1$.

Wegen $w \in L^\omega(A)$ gibt es eine Berechnungsfolge σ für w in A in der unendlich viele Zustände aus F auftreten.

Beweis

Teil 5

Sei $w \in U_1 U_2^\omega \cap L^\omega(A)$ gegeben und u ein weiteres Wort aus $U_1 U_2^\omega$. Es ist $u \in L^\omega(A)$ zu zeigen.

Wegen $w \in U_1 U_2^\omega$ können wir w wie folgt zerlegen:

$$w = w_1 w_2 \dots w_n \dots$$

wobei $w_1 \in U_1$ und $w_i \in U_2$ für alle $i > 1$.

Wegen $w \in L^\omega(A)$ gibt es eine Berechnungsfolge σ für w in A in der unendlich viele Zustände aus F auftreten.

Wir interessieren uns für bestimmte Stützpunkte in der Folge σ ; mit q_n bezeichnen wir den Zustand in σ , der nach Einlesen des Teilwortes w_n und vor Beginn des Einlesens von w_{n+1} eingenommen wird.

Beweis

Teil 5

Sei $w \in U_1 U_2^\omega \cap L^\omega(A)$ gegeben und u ein weiteres Wort aus $U_1 U_2^\omega$. Es ist $u \in L^\omega(A)$ zu zeigen.

Wegen $w \in U_1 U_2^\omega$ können wir w wie folgt zerlegen:

$$w = w_1 w_2 \dots w_n \dots$$

wobei $w_1 \in U_1$ und $w_i \in U_2$ für alle $i > 1$.

Wegen $w \in L^\omega(A)$ gibt es eine Berechnungsfolge σ für w in A in der unendlich viele Zustände aus F auftreten.

Wir interessieren uns für bestimmte Stützpunkte in der Folge σ ; mit q_n bezeichnen wir den Zustand in σ , der nach Einlesen des Teilwortes w_n und vor Beginn des Einlesens von w_{n+1} eingenommen wird.

Zusätzlich sei $q_0 = s_0$ der Anfangszustand.

Beweis

Teil 5

Sei $w \in U_1 U_2^\omega \cap L^\omega(A)$ gegeben und u ein weiteres Wort aus $U_1 U_2^\omega$. Es ist $u \in L^\omega(A)$ zu zeigen.

Wegen $w \in U_1 U_2^\omega$ können wir w wie folgt zerlegen:

$$w = w_1 w_2 \dots w_n \dots$$

wobei $w_1 \in U_1$ und $w_i \in U_2$ für alle $i > 1$.

Wegen $w \in L^\omega(A)$ gibt es eine Berechnungsfolge σ für w in A in der unendlich viele Zustände aus F auftreten.

Wir interessieren uns für bestimmte Stützpunkte in der Folge σ ; mit q_n bezeichnen wir den Zustand in σ , der nach Einlesen des Teilwortes w_n und vor Beginn des Einlesens von w_{n+1} eingenommen wird.

Zusätzlich sei $q_0 = s_0$ der Anfangszustand.

Sei schließlich $u \in U_1 U_2^\omega$, genauer

$$u = u_1 u_2 \dots u_n \dots$$

mit $u_1 \in U_1$ und $u_i \in U_2$ für alle $i > 1$.

Beweis zu Teil 5

Fortsetzung

Da U_1 und U_2 nach Voraussetzung $\equiv_A$ Äquivalenzklassen sind gilt für alle i

$$w_i \equiv_A u_i$$

Beweis zu Teil 5

Fortsetzung

Da U_1 und U_2 nach Voraussetzung $\equiv_A$ Äquivalenzklassen sind gilt für alle i

$$w_i \equiv_A u_i$$

Wir konstruieren eine Berechnungsfolge ρ für u , welche die Zustände q_n in derselben Reihenfolge wie σ durchläuft.

Beweis zu Teil 5

Fortsetzung

Da U_1 und U_2 nach Voraussetzung $\equiv_A$ Äquivalenzklassen sind gilt für alle i

$$w_i \equiv_A u_i$$

Wir konstruieren eine Berechnungsfolge ρ für u , welche die Zustände q_n in derselben Reihenfolge wie σ durchläuft.

Nach Definition der q_i gilt auf jeden Fall $w_n \in L_{q_n, q_{n+1}}$.

Beweis zu Teil 5

Fortsetzung

Da U_1 und U_2 nach Voraussetzung $\equiv_A$ Äquivalenzklassen sind gilt für alle i

$$w_i \equiv_A u_i$$

Wir konstruieren eine Berechnungsfolge ρ für u , welche die Zustände q_n in derselben Reihenfolge wie σ durchläuft.

Nach Definition der q_i gilt auf jeden Fall $w_n \in L_{q_n, q_{n+1}}$.

Wegen $w_n \equiv_A u_n$ gilt dann auch $u_n \in L_{q_n, q_{n+1}}$. Man kann also den Weg von q_n nach q_{n+1} in ρ interpolieren. Kommt in σ ein Finalzustand zwischen q_n und q_{n+1} vor, so gilt $w_n \in L_{q_n, q_{n+1}}^F$ und wegen $w_n \equiv_A u_n$ auch $u_n \in L_{q_n, q_{n+1}}^F$. Das Teilstück von ρ zwischen q_n und q_{n+1} kann demnach auch so gewählt werden, daß darin ein Finalzustand vorkommt. Das zeigt, daß ρ eine akzeptierende Berechnungsfolge für u ist und damit $u \in L^\omega(A)$.

Satz von Ramsey

Sei $P_1, \dots, P_k$ eine endliche Partition aller zweielementigen Teilmengen der Menge $\mathbf{N}$ der natürlichen Zahlen.

Dann gibt es eine unendliche Teilmenge $T \subseteq \mathbf{N}$ und ein i mit $1 \leq i \leq k$, so daß alle zweielementigen Teilmengen von Elementen aus T in P_i liegen.

In Formeln:

aus $P_1 \uplus \dots \uplus P_k = \mathbf{N}^{[2]}$ folgt die Existenz einer unendlichen Menge $T \subseteq \mathbf{N}$, so daß $T^{[2]} \subseteq P_i$ für ein i .

Satz von Ramsey

Sei $P_1, \dots, P_k$ eine endliche Partition aller zweielementigen Teilmengen der Menge $\mathbf{N}$ der natürlichen Zahlen.

Dann gibt es eine unendliche Teilmenge $T \subseteq \mathbf{N}$ und ein i mit $1 \leq i \leq k$, so daß alle zweielementigen Teilmengen von Elementen aus T in P_i liegen.

In Formeln:

aus $P_1 \uplus \dots \uplus P_k = \mathbf{N}^{[2]}$ folgt die Existenz einer unendlichen Menge $T \subseteq \mathbf{N}$, so daß $T^{[2]} \subseteq P_i$ für ein i .

T heißt eine **homogene** Menge für $P_1, \dots, P_k$

Satz von Ramsey

Sei $P_1, \dots, P_k$ eine endliche Partition aller zweielementigen Teilmengen der Menge $\mathbf{N}$ der natürlichen Zahlen.

Dann gibt es eine unendliche Teilmenge $T \subseteq \mathbf{N}$ und ein i mit $1 \leq i \leq k$, so daß alle zweielementigen Teilmengen von Elementen aus T in P_i liegen.

In Formeln:

aus $P_1 \uplus \dots \uplus P_k = \mathbf{N}^{[2]}$ folgt die Existenz einer unendlichen Menge $T \subseteq \mathbf{N}$, so daß $T^{[2]} \subseteq P_i$ für ein i .

T heißt eine **homogene** Menge für $P_1, \dots, P_k$

Beweis im Buch von Monk oder dem von Felscher oder in der Originalarbeit von Ramsey (1929).

Satz von Ramsey

Visuelles Beispiel

Wir identifizieren $\mathcal{N}^{[2]}$ mit $\{(n, m) \mid n < m\}$

Satz von Ramsey

Visuelles Beispiel

Wir identifizieren $\mathbf{N}^{[2]}$ mit $\{(n, m) \mid n < m\}$

$$P_1 = \{(n, m) \in \mathbf{N}^{[2]} \mid m - n \text{ ist ungerade}\}$$

$$P_2 = \{(n, m) \in \mathbf{N}^{[2]} \mid m - n \text{ ist gerade}\}$$

Satz von Ramsey

Visuelles Beispiel

Wir identifizieren $\mathbf{N}^{[2]}$ mit $\{(n, m) \mid n < m\}$

$$P_1 = \{(n, m) \in \mathbf{N}^{[2]} \mid m - n \text{ ist ungerade}\}$$

$$P_2 = \{(n, m) \in \mathbf{N}^{[2]} \mid m - n \text{ ist gerade}\}$$

Satz von Ramsey

Visuelles Beispiel

Wir identifizieren $\mathbf{N}^{[2]}$ mit $\{(n, m) \mid n < m\}$

$$P_1 = \{(n, m) \in \mathbf{N}^{[2]} \mid m - n \text{ ist ungerade}\}$$

$$P_2 = \{(n, m) \in \mathbf{N}^{[2]} \mid m - n \text{ ist gerade}\}$$

Eine homogene Menge ist
z.B.

$$T = \{2n \mid n \in \mathbf{N}\}$$

Lemma

Zu jedem $w \in V^\omega$ gibt es $\equiv_A$ -Äquivalenzklassen U und W mit $w \in UW^\omega$.

Lemma

Zu jedem $w \in V^\omega$ gibt es $\equiv_A$ -Äquivalenzklassen U und W mit $w \in UW^\omega$.

Beweis:

Lemma

Zu jedem $w \in V^\omega$ gibt es $\equiv_A$ -Äquivalenzklassen U und W mit $w \in UW^\omega$.

Beweis:

Seien $U_1, \dots, U_n$ alle Äquivalenzklassen von $\equiv_A$ und bezeichne für $i < j$ $w_{i,j}$ das endliche Teilwort $w(i) \dots w(j-1)$ von w .

Lemma

Zu jedem $w \in V^\omega$ gibt es $\equiv_A$ -Äquivalenzklassen U und W mit $w \in UW^\omega$.

Beweis:

Seien $U_1, \dots, U_n$ alle Äquivalenzklassen von $\equiv_A$ und bezeichne für $i < j$ $w_{i,j}$ das endliche Teilwort $w(i) \dots w(j-1)$ von w .

Dann wird durch

$$P_r = \{\{i, j\} \in \mathbf{N}^{[2]} \mid [w_{i,j}]_{\equiv_A} = U_r\}$$

eine Partition von $\mathbf{N}^{[2]}$ definiert.

Lemma

Zu jedem $w \in V^\omega$ gibt es $\equiv_A$ -Äquivalenzklassen U und W mit $w \in UW^\omega$.

Beweis:

Seien $U_1, \dots, U_n$ alle Äquivalenzklassen von $\equiv_A$ und bezeichne für $i < j$ $w_{i,j}$ das endliche Teilwort $w(i) \dots w(j-1)$ von w .

Dann wird durch

$$P_r = \{ \{i, j\} \in \mathbf{N}^{[2]} \mid [w_{i,j}]_{\equiv_A} = U_r \}$$

eine Partition von $\mathbf{N}^{[2]}$ definiert.

Nach dem Satz von Ramsey gibt es eine unendliche Teilmenge $T \subseteq \mathbf{N}$ und ein k mit $T^{[2]} \subseteq P_k$.

Lemma

Zu jedem $w \in V^\omega$ gibt es $\equiv_A$ -Äquivalenzklassen U und W mit $w \in UW^\omega$.

Beweis:

Seien $U_1, \dots, U_n$ alle Äquivalenzklassen von $\equiv_A$ und bezeichne für $i < j$ $w_{i,j}$ das endliche Teilwort $w(i) \dots w(j-1)$ von w .

Dann wird durch

$$P_r = \{ \{i, j\} \in \mathbf{N}^{[2]} \mid [w_{i,j}]_{\equiv_A} = U_r \}$$

eine Partition von $\mathbf{N}^{[2]}$ definiert.

Nach dem Satz von Ramsey gibt es eine unendliche Teilmenge $T \subseteq \mathbf{N}$ und ein k mit $T^{[2]} \subseteq P_k$.

Sei i_0 das kleinste Element in T und $U = [w \downarrow (i_0)]_{\equiv_A}$, dann gilt offensichtlich

$$w \in UU_k^\omega$$

Abgeschlossenheit unter Komplementen

Ist $L \subseteq V^\omega$ eine ω -reguläre Menge, dann auch $V^\omega \setminus L$

Abgeschlossenheit unter Komplementen

Ist $L \subseteq V^\omega$ eine ω -reguläre Menge, dann auch $V^\omega \setminus L$

Beweis

Abgeschlossenheit unter Komplementen

Ist $L \subseteq V^\omega$ eine ω -reguläre Menge, dann auch $V^\omega \setminus L$

Beweis

Sei A ein Büchi Automat mit $L^\omega(A) = L$.

Abgeschlossenheit unter Komplementen

Ist $L \subseteq V^\omega$ eine ω -reguläre Menge, dann auch $V^\omega \setminus L$

Beweis

Sei A ein Büchi Automat mit $L^\omega(A) = L$.

$$V^\omega \setminus L = \bigcup_{(U_1, U_2) \in \mathcal{R}} U_1 U_2^\omega$$

dabei gilt $(U_1, U_2) \in \mathcal{R}$ genau dann, wenn $U_1 U_2^\omega \cap L = \emptyset$.

U_i sind $\equiv_A$ Äquivalenzklassen.

Varianten von Büchi Automaten

Menge von Anfangszuständen

Zu jedem Büchi Automaten $\mathcal{C} = (S, V, S_0, \delta, F)$ mit einer Menge von Anfangszuständen gibt es einen Büchi Automaten $\mathcal{A}$ mit einem einzigen Anfangszustand und

$$L^\omega(\mathcal{C}) = L^\omega(\mathcal{A})$$

Varianten von Büchi Automaten

Menge von Anfangszuständen

Zu jedem Büchi Automaten $\mathcal{C} = (S, V, S_0, \delta, F)$ mit einer Menge von Anfangszuständen gibt es einen Büchi Automaten $\mathcal{A}$ mit einem einzigen Anfangszustand und

$$L^\omega(\mathcal{C}) = L^\omega(\mathcal{A})$$

Beweis:

Varianten von Büchi Automaten

Menge von Anfangszuständen

Zu jedem Büchi Automaten $\mathcal{C} = (S, V, S_0, \delta, F)$ mit einer Menge von Anfangszuständen gibt es einen Büchi Automaten $\mathcal{A}$ mit einem einzigen Anfangszustand und

$$L^\omega(\mathcal{C}) = L^\omega(\mathcal{A})$$

Beweis:

Sei $S_i = \{s_1, \dots, s_k\}$.

Varianten von Büchi Automaten

Menge von Anfangszuständen

Zu jedem Büchi Automaten $\mathcal{C} = (S, V, S_0, \delta, F)$ mit einer Menge von Anfangszuständen gibt es einen Büchi Automaten $\mathcal{A}$ mit einem einzigen Anfangszustand und

$$L^\omega(\mathcal{C}) = L^\omega(\mathcal{A})$$

Beweis:

Sei $S_i = \{s_1, \dots, s_k\}$.

Wir setzen $\mathcal{C}_i = (S, V, s_i, \delta, F)$.

Varianten von Büchi Automaten

Menge von Anfangszuständen

Zu jedem Büchi Automaten $\mathcal{C} = (S, V, S_0, \delta, F)$ mit einer Menge von Anfangszuständen gibt es einen Büchi Automaten $\mathcal{A}$ mit einem einzigen Anfangszustand und

$$L^\omega(\mathcal{C}) = L^\omega(\mathcal{A})$$

Beweis:

Sei $S_i = \{s_1, \dots, s_k\}$.

Wir setzen $\mathcal{C}_i = (S, V, s_i, \delta, F)$.

Offensichtlich gilt $L^\omega(\mathcal{C}) = \bigcup_{i=1}^k L^\omega(\mathcal{C}_i)$.

Varianten von Büchi Automaten

Menge von Anfangszuständen

Zu jedem Büchi Automaten $\mathcal{C} = (S, V, S_0, \delta, F)$ mit einer Menge von Anfangszuständen gibt es einen Büchi Automaten $\mathcal{A}$ mit einem einzigen Anfangszustand und

$$L^\omega(\mathcal{C}) = L^\omega(\mathcal{A})$$

Beweis:

Sei $S_i = \{s_1, \dots, s_k\}$.

Wir setzen $\mathcal{C}_i = (S, V, s_i, \delta, F)$.

Offensichtlich gilt $L^\omega(\mathcal{C}) = \bigcup_{i=1}^k L^\omega(\mathcal{C}_i)$.

Die Existenz von $\mathcal{A}$ folgt jetzt aus Abgeschlossenheit ω -regulärer Mengen unter Vereinigung.

Erweiterte Büchi Automaten

Ein ω -Wort w wird von dem erweiterten Büchi Automat

$$\mathcal{A} = (S, V, s_0, \delta, F_1, \dots, F_n)$$

akzeptiert, wenn es eine Berechnungsfolge s für w gibt, die für jedes j , $1 \leq j \leq n$ unendlich viele Zustände aus F_j enthält.

Erweiterte Büchi Automaten

Ein ω -Wort w wird von dem erweiterten Büchi Automat

$$\mathcal{A} = (S, V, s_0, \delta, F_1, \dots, F_n)$$

akzeptiert, wenn es eine Berechnungsfolge s für w gibt, die für jedes j , $1 \leq j \leq n$ unendlich viele Zustände aus F_j enthält.

Also

$$L^\omega(\mathcal{A}) = \{w \in V^\omega \mid \text{es gibt eine Berechnungsfolge } s \text{ für } w, \\ \text{so daß für jedes } j, 1 \leq j \leq n, \\ \text{die Menge } \{i \mid s_i \in F_j\} \text{ unendlich ist.}\}$$

Erweiterte Büchi Automaten

Reduktion

Zu jedem erweiterten Büchi Automaten $\mathcal{A}_e$ gibt es einen einfachen Büchi Automaten $\mathcal{A}$ mit

$$L^\omega(\mathcal{A}_e) = L^\omega(\mathcal{A})$$

Müller Automaten

Definition

Ein Müller Automat $\mathcal{M} = (S, V, s_0, \delta, \mathcal{F})$ ist ein endlicher Automat $\mathcal{M} = (S, V, s_0, \delta)$ ohne Angabe von Endzuständen, aber stattdessen mit einer Menge $\mathcal{F}$ nicht leerer Endzustandsmengen, d.h. für alle $F \in \mathcal{F}$ gilt $F \subseteq S$ und $F \neq \emptyset$.

Ist $\sigma = s_1, \dots, s_n, \dots$ eine Zustandsfolge, so bezeichnet $In(\sigma)$ die Menge der Zustände, die unendlich oft in σ vorkommen, also

$$In(\sigma) = \{s \in S \mid \text{es gibt unendlich viele } n \text{ mit } s_n = s\}$$

Die von einem Müller Automat $\mathcal{M} = (S, V, s_0, \delta, \mathcal{F})$ akzeptierte ω -Sprache wird definiert durch:

$$L^\omega(\mathcal{M}) = \{w \in V^\omega \mid In(\sigma) \in \mathcal{F} \text{ für eine Berechnungsfolge } \sigma \text{ für } w\}$$

Müller Automaten

Die Klasse der von nichtdeterministischen Büchi Automaten akzeptierten ω -Sprachen stimmt überein mit der von nichtdeterministischen Müller Automaten akzeptierten ω -Sprachen.